


## Gaviota patiamarilla *Larus michaellis*

**Estatus:** especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

### Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
32	13,89	15,28	7,6

**IKA** (número de aves registradas x 10 km de recorrido)




La gaviota patiamarilla ha sido registrada en 144 cuadrículas en los dos años de estudio (125 en 2004 y 140 en 2006), presente en todo el territorio del municipio. Es una especie abundante en el sector Zona Urbana y común en el resto de sectores del entorno rural (ver tabla).

En 2006 se registraron 299 parejas en la ciudad de Santander (Bhs consultores ambientales), con la mayor parte de las parejas agregadas en la zona centro, a ambos lados del eje Cuatro Caminos-Casimiro Sainz (73% de los nidos), otros núcleos importantes de nidificación se encuentra en Castilla-Marqués de la Hermida, Tetuán-Canalejas y Fernando de los Ríos, mientras que General Dávila, Sardinero y Cazoña son zonas minoritarias de reciente colonización. En la isla de Mouro nidifican unas 100 parejas

### Uso del hábitat

Los patrones de uso del hábitat de la gaviota patiamarilla en Santander son principalmente urbanos (69,6% de las observaciones), debido en gran medida a la nidificación en tejados y azoteas de Santander, aunque también a la utilización oportunista de alimentos presentes en la ciudad (basuras, desperdicios del mercado y del puerto pesquero, comida dejada para los gatos callejeros, palomas...).



### Vulnerabilidad y medidas de conservación

**Situación en España:** presente a lo largo de todo el litoral peninsular, se registró un gran incremento poblacional en las décadas de 1970, 1980 y principios de la de 1990, con una posterior estabilización; nidifica en islas, islotes, acantilados costeros, playas, marismas y edificaciones urbanas (Martí y del Moral 2003).

**Situación en Santander:** en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa, el 23,3% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque al tratarse de una especie principalmente urbana esto no representa un problema de conservación para la especie.

**Medidas de conservación:** las molestias ocasionadas por las parejas urbanas, principalmente las potentes vocalizaciones durante la época de nidificación, han convertido a la gaviota patiamarilla en una especie conflictiva en Santander, lo que ha motivado al Ayuntamiento a iniciar en 2005 un programa de retirada de nidos. Sin embargo, la colonia de Mouro debe ser objeto de medidas de conservación, principalmente evitando las molestias durante la época de cría.

