


Charrán común *Sterna hirundo*



Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander en la época estival.

Distribución y abundancia



El charrán común ha sido registrado en 10 cuadrículas en los dos años de estudio (6 en 2004 y 7 en 2006).


En Santander es una especie asociada a la bahía de Santander, en la Dársena Sur de Raos se localiza una pequeña colonia en un barco semihundido.

| zona urbana | Cueto-Monte | Maruca-S.Román | Peñacastillo-Ojaiz |
|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 0,679 | 0,104 | --- | --- |

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander la distribución del charrán común se asocia a la bahía, vinculada a la presencia de una colonia en la Dársena Sur de Raos.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: unas 8.000 parejas reproductoras en España concentradas principalmente en el delta del Ebro, la albufera de Valencia y las salinas de Santa Pola; la colonia de la bahía de Santander es la única del Cantábrico y se estableció en 1989 (Martí y del Moral 2003). Está catalogada como “casi amenazada” en el Libro Rojo de las Aves de España e incluida en el anexo I de la Directiva Aves.

Situación en Santander: El charrán común se reproduce en la bahía de Santander desde el año 1989 (De Andrés *et al.* 2003), y la colonia tiene un gran interés de conservación ya que es la única en toda la costa cantábrica. La ampliación del puerto de Santander es una amenaza para la colonia, ya que se contempla el relleno de la Dársena Sur de Raos.

Medidas de conservación: evitar molestias vinculadas a las actividades humanas durante la época de cría; evitar la desecación de la Dársena Sur de Raos; habilitar nuevas islas flotantes que permitan el establecimiento de un mayor número de parejas reproductoras, tanto en la Dársena Sur de Raos como en otras zonas de la Bahía frecuentadas por la especie.



SEO/BirdLife