




Paloma bravía *Columba livia f. domestica*

Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia




zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
218,7	69,81	68,29	11,03

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

Los patrones de uso del hábitat de la paloma bravía en Santander son principalmente urbanos, con un 84,7% de observaciones en zonas urbanas, la presencia en el entorno rural está asociada a la existencia de algunos palomares dispersos por los núcleos rurales del municipio. Las mayores densidades en el centro urbano se explican por la mayor disponibilidad de lugares para nidificar (presencia de edificios antiguos) y mayor aporte de alimento en plazas y parques; y en el polígono de Raos debido a la presencia de naves de piensos y grano accesibles a las palomas.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: presente en prácticamente toda la Península, la forma semidoméstica es muy abundante en algunas zonas agrícolas y en las ciudades de mayor tamaño (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE señalan una tendencia positiva en sus poblaciones (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es escasa, el 23,3% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque al tratarse de una especie urbana esto no representa un problema de conservación para la especie.

Medidas de conservación: se trata de una de las tres especies de aves conflictivas en Santander, por lo que no se contempla ninguna medida de conservación. De hecho se ha elaborado un plan de gestión de la especie en Santander con el objetivo de reducir su número.