


Bisbita campestre *Anthus campestris*



Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander en la época estival.

Distribución y abundancia



El bisbita campestre ha sido registrado en 6 cuadrículas en los dos años de estudio (3 en 2004 y 5 en 2006).


En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida), que sólo ha sido registrada en los sectores de Cueto-Monte y Maruca-S.Román.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
---	---	0,697	---

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander la distribución del bisbita campestre se asocia a la costa norte del municipio, con la mayor parte de las observaciones realizadas durante 2006 en zonas de campiña, y una fracción significativa (44,4%) en una estrecha franja de vegetación dispersa entre la costa rocosa de escasa pendiente y los prados de siega.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: su principal zona de reproducción coincide con la mitad septentrional, aunque falta en la mayor parte de la cornisa cantábrica (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia positiva pero no significativa (Palomino *et al.* 2006). Incluida en el anexo I de la Directiva Aves.

Situación en Santander: en el municipio de Santander está protegida la mayor parte de su área de distribución, el 100% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Se trata de una especie muy escasa y localizada, resultando por este motivo especialmente vulnerable.

Medidas de conservación: conservar la vegetación de transición entre la costa rocosa y los prados de siega, este aspecto deberá ser tenido en cuenta en el diseño de la senda costera; conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional.



SEO/BirdLife