


Petirrojo *Erithacus rubecula*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



El petirrojo ha sido registrado en 80 cuadrículas en los dos años de estudio (40 en 2004 y 64 en 2006), mostrando una distribución asociada a zonas urbanas y núcleos rurales.


En Santander es una especie presente en más de la mitad del territorio pero escasa (ver tabla), las mayores abundancias se han registrado en el sector Zona Urbana y en el sector Cueto-Monte.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
1,853	1,517	1,020	0,891

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

El petirrojo está ligado principalmente a las zonas urbanas de Santander, el 74,1% de las observaciones se han realizado en parques urbanos y zonas ajardinadas, su presencia en la campiña es marginal debido al carácter forestal de esta especie y el escaso desarrollo de árboles y arbustos en la campiña de Santander.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: reside en la mayor parte de la mitad septentrional de la Península, su distribución en España está condicionada de manera positiva por la precipitación y negativa por la temperatura (Martí y del Moral 2003), en el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia positiva (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 26,3 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque las mejores áreas para la especie se localizan en zonas urbanas y su conservación está ligada a una adecuada gestión de parques y jardines.

Medidas de conservación: realizar un diseño y manejo de las zonas verdes urbanas con criterios ambientales que favorezcan a las aves presentes en estos espacios.



SEO/BirdLife