




## Colirrojo real *Phoenicurus phoenicurus*

**Estatus:** especie migradora transahariana, habitual en el municipio de Santander en la época estival.

### Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
---	---	0,093	---

**IKA** (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

### Uso del hábitat

El colirrojo real es una especie principalmente forestal, aunque en la cornisa cantábrica utiliza también zonas de campiña e incluso núcleos urbanos. En los años 2004 y 2006 sólo se tuvieron tres registros, uno en 2004 de un ejemplar en paso en el parque de Matalaños, otro en 2004 de una pareja en la campiña de Cueto y otra pareja en 2006 en la arboleda de la finca de Corbán.

### Vulnerabilidad y medidas de conservación

**Situación en España:** distribución muy fragmentada con una presencia más significativa en la vertiente subcantábrica de Castilla y León y Álava, y el Sistema Ibérico norte de Burgos, La Rioja y Soria, en la cornisa cantábrica habitual en el oriente asturiano, en estas zonas ocupa bosques caducifolios, campiñas y núcleos urbanos (Martí y del Moral 2003). Está catalogada como “vulnerable” en el Libro Rojo de las Aves de España.

**Situación en Santander:** en el municipio de Santander la protección del área de distribución es alta, el 66,7% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU; aunque la finca de Seminario de Corbán, donde se localizó una pareja en 2006, queda pendiente de protección.

**Medidas de conservación:** conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes, especialmente la finca del Seminario de Corbán, generando una estructura abierta con claros y sotobosque diverso; crear nuevas masas forestales de especies autóctonas; facilitar lugares de anidamiento mediante la instalación de cajas nido.

