


Buscarla pintoja *Locustella naevia*



Estatus: especie migradora transhariana, habitual en el municipio de Santander en la época estival.

Distribución y abundancia



La buscarla pintoja ha sido registrada en 10 cuadrículas en los dos años de estudio (3 en 2004 y 7 en 2006).


Es una especie muy escasa y presente de manera dispersa en los distintos sectores del municipio (ver tabla).

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,049	0,058	0,034	0,261

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander la buscarla pintoja ocupa principalmente zonas de campiña (62,5% de las observaciones), en las que utiliza principalmente los setos, y matorrales diversos (37,5% de las observaciones en brezales, tojales y zarzales).



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: se distribuye casi exclusivamente por la franja cantábrica, desde el norte de A Coruña hasta la frontera con Francia, desaparece a partir de los 600 m; su principal hábitat de cría son las zonas abiertas dominadas por vegetación herbácea alta en combinación con matorrales poco densos y algunos arbustos (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 50% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. A pesar de las limitaciones en su urbanización el sector este de la vaguada de las Llamas ha sufrido una gran transformación como resultado de las obras del Parque de las Llamas, y se han eliminado gran parte de los zarzales en los que se registraron varias parejas en el año 2006.

Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; conservar los setos y parches de matorral (zarzales, brezales y tojales).