


Zarcero común *Hippolais polyglotta*

Estatus: especie migradora transahariana, habitual en el municipio de Santander en la época estival.



Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,649	1,613	2,129	3,128


IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

El zarcero común ha sido registrado en 61 cuadrículas en los dos años de estudio (19 en 2004 y 56 en 2006).

En Santander es una especie común y ampliamente distribuida por los sectores del entorno rural del municipio y escasa en el sector Zona Urbana (ver tabla).

Uso del hábitat

En Santander la distribución del zarcero común se asocia al entorno rural del municipio, con la mayor parte de las observaciones realizadas durante 2006 en zonas de campiña (64%), aunque selecciona positivamente las escasas manchas arbustivas (con un 24,7% de las observaciones). La utilización del medio urbano es marginal.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: se distribuye prácticamente por toda la Península, excepto las cordilleras más elevadas, donde ocupa un amplio espectro de hábitats siempre que haya matorrales (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia positiva pero no significativa (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 49,2 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Se trata de una especie que depende a escala local de la campiña y manchas arbustivas.

Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; conservar los setos y parches de matorral (zarzales, brezales y tojales); crear pequeños bosques isla con las especies propias del encinar costero.



SEO/BirdLife