


Curruca cabecinegra *Sylvia melanocephala*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



La curruca cabecinegra ha sido registrada en 9 cuadrículas en los dos años de estudio (2 en 2004 y 7 en 2006), mostrando una distribución asociada a la campiña norte.


En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida) que se distribuye de manera dispersa por los sectores de Cueto-Monte y Maruca-S.Román.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
---	0,347	0,422	---

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander la distribución de la curruca cabecinegra se asocia al entorno rural del municipio, con la mayor parte de las observaciones realizadas durante 2006 en zonas de campiña (90,9%), donde ocupa los setos, y manchas de matorral (zarzales y tojales).



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: como especie termófila, muestra su principal núcleo poblacional en la mitad sur, costa mediterránea y valle del Ebro, aunque existe una población aislada en el litoral cántabro-vizcaíno; en la cornisa cantábrica está ligada a matorrales y encinares costeros del piso termocolino (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia general estable (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander está protegida la mayor parte de su área de distribución, el 88,9% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. A escala local depende de los setos y manchas de matorral (zarzales y tojales).

Medidas de conservación: potenciar la creación y conservación de setos y zonas arbustivas y, en la campiña norte dominada por muros de piedra en seco, crear pequeños bosques isla con las especies propias del encinar costero.