


Alcaudón dorsirrojo *Lanius collurio*



Estatus: especie migradora, habitual en el municipio de Santander entre abril y septiembre.

Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
---	0,116	0,210	0,263

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)


El alcaudón dorsirrojo ha sido registrado en 8 cuadrículas en los dos años de estudio (2 en 2004 y 7 en 2006), mostrando una distribución asociada al paisaje de campiña.

En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida) con presencia dispersa en el entorno rural.

En 2004 se registró su reproducción en la vaguada de las Llamas pero la transformación que están suponiendo las obras del Parque de las Llamas ha provocado su desaparición como reproductor de esta zona.

Uso del hábitat

En Santander el alcaudón dorsirrojo está ligado al paisaje de campiña, el escaso desarrollo de setos y zonas arbustivas es un factor limitante para esta especie y condiciona la presencia de un reducido número de parejas en el municipio.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: esta presente en el tercio norte, donde habita lugares húmedos y abiertos con arbustos, hasta los 1.500 m de altitud, preferentemente campiña con mosaico de prados, cultivos y setos; orlas arbustivas espinosas de bosques, normalmente robledales y hayedos; y pastizales de montaña con arbustos. Ha mostrado una tendencia negativa en los últimos años (Martí y del Moral 2003), aunque los datos del programa SACRE para el periodo 1998-2005 muestran una tendencia estable (Palomino *et al.* 2006). Incluido en el anexo I de la Directiva Aves.

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 50 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Se trata de una especie que depende a escala local de la campiña, por lo que es muy sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario.

Medidas de conservación: conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; potenciar la creación y conservación de setos y zonas arbustivas y, en la campiña norte dominada por muros de piedra en seco, crear pequeños bosques isla con las especies propias del encinar costero.