


## Corneja común *Corvus corone*

**Estatus:** especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.



### Distribución y abundancia



La corneja común ha sido registrada en 55 cuadrículas en los dos años de estudio (34 en 2004 y 39 en 2006).


Presenta una distribución dispersa por el municipio y es escasa en los sectores Zona Urbana, Cueto-Monte y Maruca-S.Román y común en Peñacastillo-Ojaiz.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,646	0,569	1,177	2,992

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

### Uso del hábitat

En Santander la corneja común esta presente tanto en el medio urbano (45,7% de las observaciones), principalmente en parques y zonas ajardinadas, como en la campiña (42,9% de las observaciones). Requiere de masas arboladas para la instalación de sus nidos.



### Vulnerabilidad y medidas de conservación

**Situación en España:** presente en toda la mitad norte peninsular, ocupa gran variedad de hábitats y prefiere medios abiertos con árboles dispersos o la periferia de bosques con cultivos, pastizales, campiñas, huertos o sotos fluviales, pero desdeña las zonas forestales extensas y cerradas (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia estable (Palomino *et al.* 2006).

**Situación en Santander:** en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 27,3 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque esto no resulta un problema de conservación para la especie debido a su adaptabilidad y la amplitud de hábitats que utiliza.

**Medidas de conservación:** conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes, y crear nuevas masas forestales de especies autóctonas.