


Cuervo *Corvus corax*

Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.



Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,111	0,590	0,419	0,750

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)


El cuervo ha sido registrado en 28 cuadrículas en los dos años de estudio (19 en 2004 y 15 en 2006).

Es muy escaso en los sectores Zona Urbana y Maruca-S.Román, y escaso en los sectores Cueto-Monte y Peñacastillo-Ojaiz.

Su distribución fragmentada refleja la localización de las dos parejas reproductoras en el municipio, una en los acantilados del entorno del Panteón del Inglés y otra en la cantera de la peña de Peñacastillo.

Uso del hábitat

En Santander el cuervo está asociado principalmente a las zonas de campiña (61,1% de las observaciones), aunque utiliza de manera significativa la cantera de Peñacastillo y la costa acantilada (33,3% de las observaciones), emplazamientos de los dos nidos.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: ampliamente distribuido en la Península, se rarifica en las llanuras manchegas y hacia el SE, irregular en Galicia y en el valle del Guadalquivir; utiliza una gran variedad de hábitats desde el nivel del mar hasta zonas de alta montaña, su distribución está influida por la disponibilidad de cantiles, cortados rocosos o acantilados donde ubica sus nidos (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es alta, el 53,6 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. La cantera de Peñacastillo tiene una gran importancia como lugar de nidificación por la especie.

Medidas de conservación: evitar actuaciones en la cantera de Peñacastillo que puedan comprometer la reproducción del cuervo en la zona.