


Estornino pinto *Sturnus vulgaris*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



El estornino pinto ha sido registrado en las 144 cuadrículas en los dos años de estudio.


En Santander es una especie muy abundante y distribuida por todo el municipio. En el sector Peñacastillo-Ojaiz se alcanzan las mayores abundancias relativas y es más escasa en el sector Zona Urbana (ver tabla).

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
67,88	123	148,8	222,1

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander el estornino pinto está presente en una gran diversidad de hábitats, ocupando tanto zonas de campiña (43% de las observaciones) como el medio urbano (34,7%) y núcleos rurales (20,2%), asociado principalmente a parques, zonas verdes, huertas y jardines.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: se distribuye por gran parte de Cataluña y el Cantábrico entre Navarra y Asturias, donde escoge campiñas litorales y bosques de media montaña; durante la última década ha tenido una expansión a lo largo de las costas, en especial la cantábrica (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 27,8% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque al tratarse de una especie urbana esto no representa un problema de conservación para la especie.

Medidas de conservación: se trata de una de las tres especies de aves conflictivas en Santander, especialmente por sus concentraciones invernales, por lo que no se contempla ninguna medida de conservación.