


Gorrión común *Passer domesticus*

Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.



Distribución y abundancia



El gorrión común ha sido registrado en las 144 cuadrículas en los dos años de estudio.


En Santander es una especie muy abundante y distribuida por todo el municipio. Se trata de la especie que alcanza las mayores abundancias relativas (ver tabla).

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
250,5	315,2	352,7	296,5

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

Los patrones de uso del hábitat del gorrión común en Santander son principalmente urbanos, con un 57,2% de observaciones en zonas urbanas y un 21,8% en núcleos rurales. A diferencia de otras aves no depende estrictamente de parques y zonas ajardinadas, utilizando también el centro urbano, polígonos industriales y otros sectores carentes de vegetación. Aunque en menor medida también está presente en la campiña.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: ampliamente distribuido por todo el territorio peninsular, muy ligada a la actividad del hombre y utiliza para criar cualquier oquedad o grieta, nidos usados por otras especies, árboles, etc. (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE señalan una tendencia general estable en sus poblaciones (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 27,8% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque al tratarse de una especie urbana esto no representa un problema de conservación para la especie.

Medidas de conservación: permitir el desarrollo de la vegetación ruderal en espacios marginales.