


## Gorrión molinero *Passer montanus*



**Estatus:** especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año

### Distribución y abundancia



| zona urbana | Cueto-Monte | Maruca-S.Román | Peñacastillo-Ojaiz |
|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 0,121       | 0,190       | 0,538          | 0,439              |

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

### Uso del hábitat

En Santander la distribución del gorrión molinero se asocia al entorno rural del municipio, con la mayor parte de las observaciones realizadas en zonas de campiña (70%), aunque utiliza de manera significativa los núcleos rurales (20%). Es una especie granívora que depende de prados y cultivos para encontrar alimento, e instala sus nidos en huecos de casas, cuadras e incluso en el cementerio de Ciriego.

### Vulnerabilidad y medidas de conservación

**Situación en España:** está bien distribuida por las mesetas norte y sur, Galicia, valle del Ebro y zonas del interior de la costa mediterránea, desde Girona hasta Alicante, en el resto es menos común, con presencia escasa y localizada; prefiere los campos de cultivo con árboles dispersos, vegas, olivares, sotos fluviales, huertos, casas de campo, grandes parques urbanos y periferias de pueblos (Martí y del Moral 2003), en el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE apuntan una tendencia global estable (Palomino *et al.* 2006).

**Situación en Santander:** en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 37,5 % de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU. Al depender a escala local de la campiña, es una especie sensible a los cambios que se produzcan en este paisaje agrario.

**Medidas de conservación:** conservar importantes superficies de prados de siega con un manejo ganadero tradicional; el gorrión molinero puede ocupar parques periurbanos, aunque no se ha registrado en los de Santander, pero se puede ver favorecido por la colocación de cajas nido; tener en cuenta la población nidificante de gorrión molinero en el proyecto de ampliación del cementerio de Ciriego.

El gorrión molinero ha sido registrado en 24 cuadrículas en los dos años de estudio (16 en 2004 y 15 en 2006), mostrando una distribución asociada al entorno rural.

Se trata de una especie que tolera cierto grado de urbanización, en gran medida debido a que en Santander depende de construcciones rurales para la instalación de sus nidos.

En Santander es una especie muy escasa, cuyas mayores abundancias se han registrado en los sectores de Maruca-San Román y PeñaCastillo-Ojaiz (ver tabla).

