


Jilguero *Carduelis carduelis*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



El jilguero ha sido registrado en 142 cuadrículas en los dos años de estudio (141 en 2004 y 139 en 2006).


En Santander es una especie abundante y distribuida por todo el municipio.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
15,06	16,78	27,83	40,47

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

En Santander el jilguero está presente en una gran diversidad de hábitats, ocupando tanto zonas de campiña (42,1% de las observaciones) como el medio urbano (38,3%), asociado principalmente a parques y zonas verdes, también es frecuente en los núcleos rurales (12,2%), asociado a huertas y jardines.



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: ocupa todo el territorio peninsular, aparece normalmente ligada a hábitats semiabiertos, a menudo con cierta cobertura arbolada o de matorral alto, como campiñas, praderías, plantaciones frutales, sotos fluviales, dehesas, olivares, fresnedas, sabinars, etc., muy frecuente también en medios urbanos y rurales (Martí y del Moral 2003). En el periodo 1998-2005 los resultados del programa SACRE señalan una tendencia general estable en sus poblaciones (Palomino *et al.* 2006).

Situación en Santander: en el municipio de Santander la protección del área de distribución es moderada, el 26,8% de las cuadrículas con presencia de esta especie cuentan con algún nivel de protección en la revisión del PGOU, aunque esto no resulta un problema de conservación para la especie dada la facilidad con la que se adapta a los cambios producidos por las actividades humanas.

Medidas de conservación: realizar un diseño y manejo de las zonas verdes urbanas con criterios ambientales que favorezcan a las aves presentes en estos espacios; permitir el desarrollo de la vegetación ruderal en espacios marginales.