


Zampullín común *Tachybaptus ruficollis*

Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.



Distribución y abundancia



zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
0,087	---	---	---


IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

El zampullín común ha sido registrado en 2 cuadrículas en los dos años de estudio (1 en 2004 y 1 en 2006), su distribución en el municipio se limita a una pareja reproductora en la charca de la Remonta, es posible que también esté presente en el canal de Raos.

En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida).

Uso del hábitat

El zampullín común sólo se ha localizado en la charca de la Remonta (100% de las observaciones).



Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: ocupa todas las zonas adecuadas de la Península aunque elude áreas de montaña por encima de los 1.100 m de altitud, depende especialmente de la densidad de la vegetación palustre (enea, carrizo ...) o arbustiva (sauces y tarajes) donde instalar los nidos (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: en el municipio de Santander queda pendiente de protección en la revisión del PGOU la charca de la Remonta, único humedal en el que se ha registrado esta especie.

Medidas de conservación: conservar la charca de la Remonta y la vegetación palustre asociada, planificando un desarrollo urbanístico en la finca de la Remonta compatible con la conservación de este humedal y la biodiversidad que sustenta.



SEO/BirdLife