


Gavilán común *Accipiter nisus*



Estatus: especie residente, habitual en el municipio de Santander a lo largo de todo el año.

Distribución y abundancia



El gavilán común ha sido registrado en 1 cuadrícula en los dos años de estudio (0 en 2004 y 1 en 2006).

En Santander es una especie rara (forma parte del 25% de especies que muestran una distribución más restringida), que sólo ha sido registrada en la finca de Corbán. Aunque la discreción de su comportamiento dificulta su detección y seguramente esté presente en otras zonas del municipio.

zona urbana	Cueto-Monte	Maruca-S.Román	Peñacastillo-Ojaiz
---	---	0,058	---

IKA (número de aves registradas x 10 km de recorrido)

Uso del hábitat

Sólo se dispone de una localización en la pequeña masa forestal de la finca de Corbán.

Vulnerabilidad y medidas de conservación

Situación en España: distribución dispersa por la Península con un mayor grado de ocupación en la mitad norte; se ve favorecido por manchas boscosas dispersas de edad joven -15-40 años- que alternan con pueblos y áreas agrícolas (Martí y del Moral 2003).

Situación en Santander: la finca de Corbán es una zona de interés para la especie que debería quedar adecuadamente protegida en la revisión del PGOU.

Medidas de conservación: conservar y ampliar las masas forestales maduras existentes; crear nuevas masas forestales de especies autóctonas.



SEO/BirdLife